

ЭТИ БЕСПОКОЙНЫЕ «ГАЗИКИ»... ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КИШЕЧНЫХ КОЛИКАХ У МЛАДЕНЦЕВ

Дискомфорт в кишечнике, вызванный повышенным газообразованием, знаком и взрослым, но особенно от избыточного скопления газов страдают дети первого года жизни. Кишечная колика мучительна и требует немедленного устранения.

Детские колики

По разным оценкам, до 70% детей первого года жизни страдают кишечными коликами. Главная причина повышенного газообразования в этом возрасте – естественная незрелость пищеварительной системы: нервная регуляция деятельности ЖКТ еще несовершенна, а выработка необходимых ферментов не «налажена».

Мелкие пузырьки газа образуют объемную пену, которая давит на стенки кишечника, заставляя их растягиваться. Мышечная ткань реагирует спазмом. Так возникает резкая, приступообразная боль – кишечная колика.

заглатывает воздух, это приводит к еще большему перерастяжению кишечника. Важно, чтобы малыш правильно брал грудь – захватывал не только сосок, но и ареолу.

При искусственном вскармливании в соску вместе с едой не должен попадать воздух, а диаметр отверстия соски не должен быть слишком большим.

После кормления младенца надо подержать несколько минут в вертикальном положении, чтобы он отрыгнул воздух.

Кормящей маме следует исключить из рациона продукты, вызывающие

ется Дисфлатил компании «Валеант Фармасьютикалс Швейцария ГмБХ».

Дисфлатил

Действующий компонент Дисфлатила, симетикон – представляет собой кремнийсодержащее соединение, обладающее поверхностной активностью и пеногасящими свойствами.

Это нетоксичное, инертное поверхностно-активное вещество не всасывается в кровь, не нарушает формирование нормальной микрофлоры и не вмешивается в биохимические процессы пищеварения. Благодаря столь высокому профилю безопасности Дисфлатил прекрасно подходит для купирования кишечных колик у новорожденных.

Симетикон разрушает пузырьки газа физическим путем, изменяя их поверхностное натяжение и, тем самым, заставляя их спадаться. Высвобождаемый газ затем легко выводится естественным путем. Малыш снова спокоен и весел!

Рекомендуемая схема применения проста: по 10–15 капель 2–3 раза в день во время или после еды.

Дисфлатил выпускается во флаконах с дозатором для капель, что исключительно удобно: надо просто добавить необходимое количество капель прямо в бутылочку с водой или смесью.

Приятный ананасовый вкус Дисфлатила нравится малышам.

Дисфлатил относится к безрецептурным препаратам и практически не имеет противопоказаний. Эффективность и безопасность делают его препаратом выбора при формировании домашней аптечки для маленького человечка.



Для быстрого устранения дискомфорта, вызванного избыточным газообразованием у взрослых и детей любого возраста, включая новорожденных.



Дисфлатил® капли

- ✔ Приятный вкус ананаса нравится детям;
- ✔ Удобный способ дозирования — капли;
- ✔ Не содержит сахара — не разрушает зубную эмаль и может применяться при сахарном диабете;
- ✔ Не влияет на привычный режим дня.

VALEANT
Pharmaceuticals International

Дисфлатил выпускается во флаконах с дозатором для капель, что исключительно удобно: надо просто добавить необходимое количество капель прямо в бутылочку с водой или смесью.

Обычно колики начинаются на 3-ей неделе жизни. В процессе или после кормления малыш внезапно раздражается криком и начинает отчаянно сучить ножками; животик его вздут и напряжен. Средняя продолжительность приступа – около 3 часов в день. Чем дольше ребенок плачет, тем больше он заглатывает воздуха; это приводит к дополнительному вздутию кишечника и усиливает болевой синдром. После отхождения газов или опорожнения кишечника боль стихает, и в промежутках между приступами ребенок спокоен и хорошо ест.

Что делать?

Прежде всего, надо обратить внимание на процесс кормления: если во время сосания ребенок

брожение, а молоко заменить кисло-молочными продуктами. Для «искусственников», страдающих коликами, существуют специальные смеси.

Иногда облегчить состояние малыша удается, приложив к животу теплую пеленку или грелку. При коликах педиатры советуют выкладывать ребенка на животик, использовать газоотводную трубку. Отхождению газов способствуют массаж (легкие поглаживающие движения по часовой стрелке вокруг пупка) и гимнастика (подтягивание согнутых в коленях ножек к животу).

При неэффективности перечисленных мероприятий назначают лекарственные средства.

Одним из наиболее заслуживающих внимания препаратов явля-

За дополнительной информацией обращайтесь в Представительство «Валеант Фармасьютикалс Швейцария ГмБХ» по адресу: 125167 Москва Нарышкинская аллея, д.5, стр. 1 Тел.: (495) 748-51-93, Факс: (495) 748-51-94

РЕКЛАМА